

¿Tiene pérdida auditiva?

Puede aparecer muy progresivamente y muchos no se percatan de inmediato de que hay un problema.

¿Padece estas situaciones?

- Le pide a los demás que repitan lo que dicen
- Pone la televisión o la radio a un volumen alto
- Tiene problemas para entender conversaciones en lugares ruidosos
- Tiene dificultad para oír las voces de mujeres y niños
- Tiene problemas para oír una conversación por teléfono
- Le resulta difícil seguir una conversación rápida

.....

Si respondió afirmativamente a más de dos de estas situaciones, es recomendable que consulte con su profesional de la audición.



STARKEY HEARING TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S.,
Carrera 13 No. 94-A-25, Oficina 504, Bogotá D.C., Colombia.

©2021 Starkey. Derechos reservados.
85402-050 6/21 BROCO322-02-LS-SC



Hear better. Live better.

¿Qué es la Pérdida auditiva?

¿Qué causa la pérdida auditiva y cómo puede afectarle?



Uno de cada cinco americanos padece pérdida auditiva

En el mundo, más de 1 de cada 20 personas, aproximadamente 432 millones de adultos y 32 millones de niños, sufren una pérdida de audición discapacitante¹. En los EE. UU., más del 50 por ciento de los adultos de más de 60 años tienen una pérdida auditiva clínicamente significativa que afecta a la comunicación diaria².

Hay muchas razones que explican el elevado número de casos, donde la población más longeva ocupa los primeros lugares de la lista. La pérdida auditiva relacionada con la edad, denominada presbiacusia, es la pérdida lenta de la audición que se produce a medida que las personas envejecen.

Principales causas de pérdida auditiva:

- Edad
- Exposición repetida a ruidos fuertes
- Infecciones
- Defectos de nacimiento o genética
- Ototoxicidad (daños en el oído interno relacionados con fármacos o sustancias químicas)



Hay dos tipos de pérdida auditiva

Neurosensorial

El tipo más común, la pérdida auditiva neurosensorial, es un problema del oído interno o del nervio auditivo. Suele ser permanente y puede tratarse con audífonos.

Conductivo

La pérdida de audición conductiva, un problema del oído externo o medio, suele ser tratable médica o quirúrgicamente. Un ejemplo común es la infección crónica del oído medio.

²Incident Hearing Loss and Comorbidity: A Longitudinal Administrative Claims Study. [Enero de 2019]. Deal, J.A., Reed, N.S., Kravetz, A. D., et al. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg, 145(1), 36–43. Doi: 10.1001/jamaoto.2018.2876

La salud auditiva y la salud en general están conectadas

Muchas personas posponen la búsqueda de ayuda para su pérdida auditiva porque piensan que es insignificante. Sin embargo, se recomienda un tratamiento precoz, ya que las investigaciones relacionan la pérdida de audición no tratada con varios problemas graves, como:

- Deterioro cognitivo y demencia
- Aislamiento social y depresión
- Mayor riesgo de caídas
- Diabetes y enfermedades del corazón
- Reducción del rendimiento laboral y del poder adquisitivo
- Irritabilidad, negativismo e ira
- Fatiga, tensión y estrés

El tratamiento temprano puede reducir el riesgo de problemas de salud relacionados

¹ Deafness and Hearing Loss. (Abril de 2021). Organización Mundial de la Salud. Extraído de: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss>